Perubahan Wilayah Risiko Penularan Penyakit Malaria dan Kasus Malaria di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2005-2015

Hana Zahira Syarif¹, Maria Hedwig Dewi Susilowati², Widyawati³

¹Geografi, Universitas Indonesia, Depok 16424

E-mail : hana.zahira@sci.ac.id

²Geografi, Universitas Indonesia, Depok 16424

E-mail : maria.hedwig@ui.ac.id

³Geografi, Universitas Indonesia, Depok 16424

E-mail : widyawati@ui.ac.id

ABSTRAK

Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia, ditularkan oleh nyamuk Anopheles betina. Malaria merupakan penyakit menular yang mengancam daerah tropis dan subtropis, penyakit ini mematikan lebih dari satu juta manusia setiap tahunnya. Berdasarkan hasil riset Kementerian Kesehatan RI tahun 2016 menunjukkan bahwa kasus malaria terkonsentrasi pada wilayah Indonesia bagian timur. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu target wilayah eliminasi yang bersih dari malaria pada tahun 2020 (Depkes, 2010). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria di Provinsi NTB tahun 2005 – 2015, serta hubungan perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria di Provinsi NTB tahun 2005 – 2015. Adapun risiko penularan malaria dapat dikaji dengan melakukan perhitungan Malaria Vulnerability Index (MLI). MLI tersebut merupakan suatu metode untuk menghitung tingkat risiko penularan malaria berdasarkan nilai bahaya dan kerentanan. MLI tersebut akan dikorelasikan dengan kasus malaria guna mengetahui hubungan perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil menunjukkan adanya perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria sejak tahun 2005 – 2015. Adapun berdasarkan analisis spasial dan uji statistik dengan menggunakan perhitungan Chi-Square diketahui bahwa tidak ada hubungan antara perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria di Provinsi NTB.

Kata Kunci

Bahaya, kerentanan, malaria, Malaria Vulnerability Index, perubahan wilayah risiko.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang memiliki ketergantungan pada alam. Apabila terjadi cuaca ekstrim, maka akan mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Faktor iklim berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit tular vektor. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya suhu udara akan mempengaruhi ekosistem, sehingga dengan adanya perubahan ekosistem maka akan mempengaruhi perkembangan biakan vektor. Contoh penyakit menular akibat vektor ialah demam berdarah dengue (DBD) dan malaria [1]

Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah manusia,

ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina. Penyakit malaria dapat menyerang semua golongan umur baik bayi, anak-anak dan orang dewasa [2]. Malaria merupakan penyakit menular yang mengancam daerah tropis dan subtropis yang mematikan lebih dari satu juta manusia setiap tahunnya. Di Indonesia kasus malaria lebih banyak terkonsentrasi di wilayah timur [3]. Angka kesakitan malaria cukup tinggi, sekitar 70 juta atau 35% penduduk Indonesia tinggal di daerah yang beresiko tertular malaria [4]. Beberapa tahun terakhir malaria merupakan salah satu penyakit yang muncul kembali (*reemerging diseases*) yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah kasus di beberapa daerah, baik di Jawa-Bali maupun di luar Jawa-Bali. Beberapa kejadian luar biasa (KLB) malaria diakibatkan karena perubahan lingkungan dimana tempat perindukan

potensi semakin luas atau semakin bertambah.

Pengendalian malaria di Indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, yang terbebas dari penularan malaria secara bertahap sampai tahun 2030. Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu target wilayah eliminasi yang bersih dari malaria pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan malaria termasuk dalam sepuluh besar penyakit yang menyerang masyarakat. Upaya-upaya pemberantasan tetap dilakukan setiap tahun namun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada tahun 2005 ditemukan kasus malaria sebanyak 10.535 jiwa. Pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 7919 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015 jumlah kasus mengalami penurunan kembali menjadi 2014 jiwa [5].

Kasus infeksi penyakit malaria menjadi salah satu konsep kunci dalam penelitian risiko penularan malaria secara spasial dan temporal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penggunaan analisa spasial dan temporal bertujuan untuk mengetahui perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria. Hal ini dikarenakan adanya transformasi wilayah yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun risiko penularan malaria dapat dikaji dengan melakukan perhitungan *Malaria Vulnerability Index* (MLI). MLI tersebut merupakan suatu metode untuk menghitung tingkat risiko penularan malaria berdasarkan nilai bahaya dan kerentanan. Selanjutnya, MLI tersebut akan dikorelasikan dengan kasus malaria guna mengetahui pengaruh perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria terhadap kasus malaria di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Alur Pikir

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu wilayah yang menjadi endemik malaria. Penelitian ini menjadikan kabupaten/kota sebagai unit analisis agar dapat diketahui pengaruh perubahan wilayah risiko penularan malaria terhadap kasus malaria di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Disamping itu, penelitian ini berpedoman pada konsep *Malaria Vulnerability Index* (MLI). Berdasarkan konsep *Malaria Vulnerability Index* (MLI) digunakan beberapa

variabel dalam menentukan bahaya dan kerentanan.

Pada aspek bahaya, indikator yang digunakan adalah suhu udara dan penggunaan tanah. Data suhu udara digunakan guna mengetahui potensi persebaran nyamuk. Hal ini dikarenakan adanya kemampuan nyamuk untuk hidup pada suhu 20-30°C. Adapun data penggunaan tanah akan dianalisa agar dapat diketahui tempat pembiakan nyamuk (*breeding place*). Pada aspek kerentanan akan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu indikator keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif.

Indikator keterpaparan meliputi kepadatan penduduk dengan asumsi bahwa kepadatan penduduk akan mengalami perubahan dalam kurun waktu sebelas tahun. Penggunaan data kepadatan penduduk digunakan karena potensi penularan penyakit malaria semakin tinggi pada wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Adapun indikator sensitivitas terdiri atas usia produktif dan status gizi balita. Penggunaan data usia produktif dikarenakan, semakin banyak usia produktif pada suatu wilayah, maka tingkat mobilitas semakin tinggi sehingga potensi penularan penyakit malaria akan semakin tinggi. Sedangkan dalam data status gizi buruk balita yang digunakan adalah data gizi buruk balita. Hal ini dikarenakan, gizi buruk mengasumsikan asupan nutrisi balita dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok balita.

Indikator kapasitas adaptif terdiri atas PDRB, jumlah murid SMA dan SMK, dan fasilitas kesehatan. Data PDRB digunakan sebagai gambaran kemampuan perekonomian wilayah. Adapun data jumlah murid SMA dan SMK menggambarkan banyaknya penduduk yang dapat menerima pengetahuan tentang kesehatan dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan data fasilitas kesehatan digunakan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam kegiatan preventif dan kuratif dalam kasus malaria dan risiko penularan penyakit malaria. Kemudian tingkat kerentanan dan bahaya digabungkan agar diketahui tingkat risiko penularan penyakit malaria pada tiap kabupaten/kota. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ialah perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria berdasarkan konsep *Malaria Vulnerability Index* (MLI) dikaitkan dengan kasus malaria. Interval yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama lima tahun.

Gambar 1. Alur Pikir

2.2 Pengumpulan Data

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, diperlukan beberapa data sekunder dari beberapa instansi terkait. Data sekunder yang dibutuhkan adalah suhu udara tahun 2005-2015 yang bersumber dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, data penggunaan tanah yang bersumber dari Balai Penelitian Tanah, data kasus malaria yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, data kepadatan penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, data usia produktif yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, data gizi buruk balita yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, data jumlah murid SMA dan SMK yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, data nilai PDRB yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, dan data fasilitas kesehatan yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Data sekunder dikumpulkan melalui cara studi instansional, selain dari instansi terkait, data diperoleh melalui survei lapang pada April 2017 guna memperkuat penelitian dengan cara pengamatan lapangan dan wawancara dengan pegawai pemerintahan dan penduduk lokal.

2.3 Pengolahan Data

Pengolahan data tabular dan statistik meliputi pengolahan data risiko dan pengolahan data kasus malaria. Pengolahan data risiko dalam penelitian ini dibagi menjadi nilai bahaya dan kerentanan yang diolah menggunakan perhitungan *Malaria Vulnerability Index* [6].

2.4 Analisis Data

Analisis spasial dengan cara overlay peta risiko dan kasus malaria. Metode overlay digunakan guna mengetahui distribusi spasial perubahan wilayah risiko dan kasus malaria. Adapun petarisiko terdiri atas peta wilayahkerentanan dan wilayah bahaya. Dalam penelitian iniyang akan dideskripsikan adalah pengklasifikasian wilayah risiko penularan penyakit malaria. Selain dalam bentuk peta, pengklasifikasian wilayah risiko penularan penyakit malariajuga akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian akan dideskripsikan dan dibandingkan secaratemporal.

Analisis statistik yang digunakan berupa analisis *Chi-square*. Pada penelitian ini penggunaan analisis *Chi-Square* berfungsi untuk mengetahui hubungan antara risiko penularan malaria dan kasus malaria di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2005-2015. Oleh karena itu, variabel terikat (Y) yang digunakan ialah jumlah kasus penyakit malaria pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi tahun 2005, 2010, dan 2015. Kemudian variabel bebas yang digunakan ialah risiko penularan penyakit malaria pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meliputi tahun 2005, 2010, dan 2015. Adapun bentuk distribusi *Chi-Square* adalah menjulur positif. Berikut ialah rumus dari analisis *Chi-Square* :

H_0 yang digunakan dalam analisis ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara risiko penularan penyakit malaria dengan kasus malaria. Sedangkan H_1 yang digunakan adalah terdapat hubungan yang signifikan antara risiko penularan penyakit malaria dengan kasus malaria. Dengan demikian akan terlihat korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. GAMBARAN UMUM PROVINSI NTB

Daerah penelitian dalam penelitian ini, terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Secara astronomis Provinsi NTB terletak pada $8^{\circ} 10' - 9^{\circ} 5' LS$ dan $115^{\circ} 46' - 119^{\circ} 5' BT$. Provinsi NTB terdiri

dari delapan kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kota Bima.

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km². Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ketinggian pada daerah penelitian yang bervariasi. Ketinggian pada Pulau Lombok yaitu berkisar antara 0 – 3.726 mdpl, sedangkan pada Pulau Sumbawa berkisar antara 0 – 2.851 mdpl (lihat Gambar 2). Selain adanya variasi ketinggian, menurut klasifikasi iklim Oldeman (1975) sebagian besar wilayah NTB tergolong beriklim kering yang terdiri atas zona C2, G3, D3, D4, E3, dan E4 [7]. Adapun penggunaan tanah terluas adalah hutan dengan luas sebesar 47 persen dari keseluruhan luas penggunaan tanah.

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk tahun 2010 – 2020 jumlah penduduk Provinsi NTB pada tahun 2015 mencapai 4.835.577 jiwa. PDRB berdasarkan harga berlaku di Provinsi NTB pada tahun 2015 sebesar 102.791.555,14 juta rupiah. Pada tahun 2015 angka melek huruf pada kelompok umur 10 tahun keatas mencapai 88,66%. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, kemampuan baca tulis penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemampuan baca tulis penduduk laki-laki mencapai 92,10%, sedangkan perempuan adalah 85,80%. Disamping itu diketahui bahwa jumlah rumah sakit umum di Provinsi NTB tahun 2015 sebanyak 26 buah, sedangkan berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 100.862 orang yang tersuspek malaria [8].

Gambar 2. Gambaran Umum Provinsi NTB

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tingkat Bahaya di Provinsi NTB Tahun 2005 – 2015

Bahaya merupakan faktor lingkungan yang memiliki peranan besar dalam meningkatnya faktor langsung terjadinya malaria. Tingkat bahaya dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu distribusi suhu udara dan distribusi penggunaan tanah. Berdasarkan Gambar 3. diketahui bahwa dinamika tingkat bahaya penularan penyakit malaria memiliki nilai yang berbeda, namun pada umumnya memiliki pola yang sama.

Pola persebaran tingkat bahaya penularan penyakit malaria di Provinsi NTB tahun 2005-2015 umumnya adalah semakin ke timur wilayah penelitian maka tingkat bahaya semakin tinggi. Hal ini dikarenakan wilayah timur seperti Kabupaten Bima memiliki suhu udara yang relatif lebih tinggi dan penggunaan tanah yang didominasi oleh hutan. Berbeda dengan Kabupaten Lombok Barat yang mana suhu udaranya relatif lebih rendah dan penggunaan tanahnya didominasi oleh selain hutan.

Secara temporal tingkat bahaya mengalami perubahan nilai. Hal ini dapat dilihat pada peningkatan yang terjadi pada tahun 2010, mengingat adanya kontribusi yang sangat besar dari suhu udara dikarenakan adanya fenomena cuaca ekstrim berupa El Nino dan La Nina. Adapun pada tahun 2015 seluruh wilayah penelitian mengalami penurunan tingkat bahaya [9].

Gambar 3. Dinamika Bahaya Tahun 2005-2010

4.2 Tingkat Kerentanan di Provinsi NTB Tahun 2005 – 2015

Kerentanan sebagai tingkat keadaan lingkungan/orang untuk bertahan dari bahaya. Kerentanan terdiri atas tiga komponen yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif. Dinamika kerentanan ini dianalisis secara temporal dan spasial. Hal ini bertujuan agar diketahui pola persebaran dari kerentanan di Provinsi NTB tahun 2005 – 2015.

Secara spasial dinamika kerentanan penularan penyakit malaria mengalami peningkatan daerah kerentanan sejak tahun 2005 hingga 2015 terutama pada kelas tinggi. Berdasarkan Gambar 4 diketahui bahwa pada tahun 2005 mayoritas kelas kerentanan tinggi berada di bagian timur, baik timur Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Adapun pada tahun 2010 nilai kerentanan tinggi berada di bagian barat Pulau Lombok dan berada pada bagian timur Pulau Sumbawa. Sedangkan pada tahun 2015 kerentanan kelas tinggi hampir melingkupi seluruh Pulau Lombok.

Disamping itu, secara temporal pada umumnya terjadi penurunan tingkat kerentanan, akan tetapi pada tahun 2010 Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan nilai kerentanan. Hal ini dikarenakan nilai kapasitas adaptif (PDRB, pendidikan, fasilitas

kesehatan) yang tidak mampu menopang nilai keterpaparan (kepadatan penduduk) serta sensitivitas (usia produktif dan gizi buruk balita). Ketidakmampuan kapasitas adaptif ini disebabkan karena terjadinya pemekaran wilayah pada tahun 2007, sehingga terjadi penurunan jumlah murid SMA dan SMK, serta penurunan jumlah fasilitas kesehatan. Adapun pada tahun 2015 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan nilai kerentanan adalah Kabupaten Lombok Timur. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan nilai kerentanan di Lombok Timur adalah menurunnya jumlah murid SMA dan SMK pada tahun 2015.

Gambar 4. Dinamika Kerentanan Tahun 2005-2010

4.3 Tingkat Risiko Penularan Penyakit Malaria di Provinsi NTB Tahun 2005-2015

Perubahan wilayah risiko ini dianalisis secara temporal dan spasial dengan melakukan *overlay* antara peta wilayah risiko tahun 2005 dan 2010, serta peta risiko tahun 2010 dan 2015. Hal ini bertujuan agar diketahui pola persebaran dari risiko penularan penyakit malaria di Provinsi NTB tahun 2005 – 2015. Berdasarkan Gambar 5, diketahui bahwa pada tahun 2010 nilai risiko pada masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Adapun pada tahun 2015 seluruh wilayah penelitian mengalami penurunan nilai risiko. Berikut merupakan analisis perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria tahun 2005 – 2010 dan 2010 – 2015.

Gambar 5. Dinamika Tingkat Risiko

4.4 Perubahan Wilayah Risiko Penularan Penyakit Malaria Tahun 2005 – 2010

Berdasarkan Gambar 6, diketahui bahwa perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria tahun 2005 – 2010 memiliki pola persebaran semakin ke barat masing-masing pulau maka terjadi peningkatan nilai risiko. Hal ini dikarenakan pada bagian barat masing-masing pulau merupakan daerah dengan kegiatan masyarakat yang tinggi, seperti contoh Kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi dan Kabupaten Sumbawa Barat yang mana merupakan pusat pertambangan provinsi. Kondisi kegiatan masyarakat yang tinggi dapat memicu tingginya nilai risiko penularan penyakit malaria.

Adapun penurunan rendah terjadi pada bagian timur wilayah penelitian atau berada di Kabupaten Bima. Hal ini dikarenakan kondisi alam Kabupaten Bima yang memicu tingginya nilai risiko seperti suhu udara yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu apabila terjadi perubahan maka akan sangat sedikit penurunannya.

Gambar 6. Perubahan Wilayah Risiko Tahun 2005-2010

4.5 Perubahan Wilayah Risiko Penularan Penyakit Malaria Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan Gambar 7, diketahui bahwa perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria tahun 2010 – 2015 memiliki pola semakin ke tengah wilayah penelitian dengan dominasi penggunaan tanah hutan maka penurunan tingkat risiko yang terjadi merupakan tingkat sangat rendah. Kondisi ini berada pada Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Hal ini dikarenakan kondisi penggunaan tanah yang didominasi hutan dapat memicu tingginya nilai risiko. Apabila terjadi perubahan nilai risiko maka perubahan yang terjadi sangat rendah.

Adapun perubahan nilai risiko tinggi berada pada wilayah dengan penggunaan tanah berupa permukiman atau yang memiliki vegetasi rendah. Perubahan penurunan tinggi berada pada bagian barat pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat dengan dominasi penggunaan tanah berupa pertanian.

Gambar 7. Perubahan Wilayah Risiko Tahun 2010-2015

4.6 Kasus Malaria Provinsi NTB

Perubahan wilayah kasus malaria didapatkan dengan melakukan *overlay* antara peta wilayah kasus malaria tahun 2005 dan 2010, serta peta kasus tahun 2010 dan 2015. Berdasarkan Gambar 8. diketahui bahwa terjadi perubahan wilayah kasus malaria sejak tahun 2005 hingga 2015. Perubahan wilayah yang terjadi menyatakan adanya penurunan pada tahun 2005 – 2010.

Berdasarkan Gambar 8. diketahui adanya penurunan kasus malaria dari tahun 2005 hingga 2015. Penurunan yang tinggi terjadi di tahun 2010. Hal ini dikarenakan adanya program eliminasi malaria secara optimal yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian angka penyakit malaria mengalami penurunan kembali hingga tahun 2015 sesuai dengan program yang dicanangkan agar pada tahun 2020 provinsi NTB bebas dari penyakit malaria. Berikut adalah penjelasan dari perubahan wilayah kasus malaria yang terjadi pada tahun 2005 – 2010 dan 2010 – 2015.

Gambar 8. Dinamika Kasus Malaria

4.7 Perubahan Wilayah Kasus Malaria di Provinsi NTB Tahun 2005-2010

Berdasarkan Gambar 9. diketahui bahwa perubahan wilayah kasus malaria pada tahun 2005 – 2010 mengalami penurunan dengan pola persebaran yang bervariasi. Pada umumnya penurunan nilai wilayah kasus yang sangat rendah berada pada bagian barat masing-masing pulau. Hal ini dikarenakan bagian barat merupakan daerah dengan topografi yang rendah, sehingga untuk timbulnya kasus malaria pun cenderung lebih rendah. Oleh karena itu maka penurunan kasus malaria sangat rendah pada daerah tersebut, kabupaten/kota yang berada pada bagian barat masing-masing pulau adalah Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun penurunan dengan tingkat sangat tinggi meliputi Kabupaten Sumbawa, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Hal ini dikarenakan sebelumnya kabupaten-kabupaten tersebut merupakan daerah

dengan tingkat kasus malarai yang sangat tinggi, sehingga setelah dilakukannya program eliminasi malaria terjadi penurunan yang sangat tinggi.

Gambar 9. Perubahan Wilayah Kasus Malaria Tahun 2005-2010

4.8 Perubahan Wilayah Kasus Malaria di Provinsi NTB Tahun 2010-2015

Perubahan wilayah kasus malaria memiliki pola persebaran yang merata akan tetapi nilai perubahan kasus malaria berbeda. Penyebab meratanya perubahan wilayah kasus malaria dikarenakan pada tahun 2010 dan 2015 jumlah kasus berada pada kelas sangat rendah, sehingga penurunan yang terjadi pun sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan keberhasilan upaya pemerintah untuk melakukan eliminasi malaria di Provinsi NTB

4.9 Hubungan Perubahan Wilayah Risiko Penularan Penyakit Malaria dan Perubahan Wilayah Kasus Malaria di Provinsi NTB Tahun 2005 -2010

Berdasarkan analisis spasial dengan melakukan *overlay* peta dan analisis statistik antara perubahan wilayah risiko dan kasus malaria tahun 2005-2015 maka didapatkan hasil hubungan sebagai berikut.

Gambar 10. Perubahan Risiko dan Kasus Malaria Tahun 2005-2010

Berdasarkan Gambar 10. diketahui bahwa perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria tahun 2005-2010

memiliki pola yang berbeda. Pada perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria diketahui bahwa pola persebarannya adalah pada bagian barat masing-masing pulau mengalami peningkatan perubahan tingkat risiko. Sedangkan pada perubahan wilayah kasus malaria memiliki pola yang tidak beraturan.

Setelah adanya pemaparan hasil tabulasi silang antara perubahan wilayah kasus malaria dan risiko penularan malaria diketahui adanya hasil uji *Chi-Square*. Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan bahwa hasil *Pearson Chi-Square* sebesar 0,690. Hal ini menyatakan bahwa nilai p value $>0,005$, sehingga H_0 diterima yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kasus malaria dan risiko penularan malaria di Provinsi NTB tahun 2005.

4.10 Hubungan Perubahan Wilayah Risiko Penularan Penyakit Malaria dan Perubahan Wilayah Kasus Malaria di Provinsi NTB Tahun 2010 -2015

Berdasarkan Gambar 11. diketahui bahwa terdapat pola yang berbeda antara perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria dan kasus malaria tahun 2010 - 2015. Pada perubahan wilayah penularan penyakit malaria memiliki pola yang tersebar secara acak, akan tetapi semakin ke tengah maka nilai perubahan wilayah semakin rendah. Adapun uji *Chi-Square* tidak menunjukkan adanya hasil. Hal ini dikarenakan variabel perubahan wilayah kasus malaria yang konstan.

Gambar 11. Perubahan Risiko dan Kasus Malaria Tahun 2010-2015

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Wilayah risiko penularan penyakit malaria di Provinsi NTB tahun 2005-2015 mengalami perubahan dan pola persebaran. Pada tahun 2005 – 2010 perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria memiliki pola persebaran semakin menuju ke wilayah dengan pusat kegiatan yang tinggi maka perubahan risiko penularan penyakit malaria

semakin meningkat. Adapun pada tahun 2010 – 2015 seluruh wilayah penelitian mengalami penurunan risiko dan memiliki pola persebaran semakin ke tengah wilayah penelitian maka perubahan wilayah risiko penularan penyakit malaria semakin rendah. Tidak ada variabel kunci yang mempengaruhi perubahan wilayah risiko. Disamping itu terdapat pula perubahan wilayah kasus penyakit malaria yang mengalami penurunan sejak tahun 2005 hingga 2015. Secara spasial dan uji *Chi-Square* menunjukkan tidak terdapat hubungan antara perubahan wilayah risiko dan kasus malaria. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa tidak selalu wilayah risiko diikuti dengan kasus malaria.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka disarankan agar penelitian menggunakan ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu berupa skala kabupaten/kota atau kecamatan. Disamping itu, pengembangan lebih lanjut sebaiknya menggunakan variabel yang lebih mendalam seperti variabel data penduduk yang beraktivitas pada malam hari guna mengetahui potensi penularan penyakit malaria yang umumnya terjadi pada masyarakat yang beraktivitas di malam hari karena adanya gigitan nyamuk *Anopheles betina*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada pembimbing penelitian, Departemen Geografi UI, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi-instansi terkait (Dinas Kesehatan Prov. NTB, BPS Prov. NTB, dan BMKG) yang telah membantu dalam menyediakan data penelitian, serta pihak lainnya yang telah membantu dan memberikan banyak saran, kritik, dan pendapat untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dixon G.P. *Climate Change and Human Health*. ISSN 1660-4601. 2010
- [2] Departemen Kesehatan RI Dirjen PPM&PLP. Modul Epidemiologi Malaria. Jakarta: Direktorat Pengendalian Penyakit Penyebaran Lingkungan. 2003
- [3] Kementerian Kesehatan RI. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kesehatan. Jakarta. 2011
- [4] Departemen Kesehatan RI Dirjen PPM&PLP. Pedoman Malaria. Jakarta. 2008
- [5] Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Pulau Sumbawa Tahun 2014. Nusa Tenggara Barat. 2015
- [6] Raharjo, M. Malaria Vulnerability Index (MLI) Untuk Manajemen Risiko Dampak Perubahan Iklim Global

-
- Terhadap Ledakan Malaria di Indonesia. Yogyakarta. 2000
- [7] Sandi, I.M. *Iklm Regional Indonesia*. Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia. 1987
- [8] Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. *Provinsi NTB Dalam Angka Tahun 2015*. Nusa Tenggara Barat. 2016
- [9] Meyer, G. Variation of Indonesian Throughflow and The El Nino Southern Oscillation. *J. Geophy.Res.*, 101 (C5):12.255 – 12.263. 1996